

STANGSELLERI

Informasjon: Av hensyn til risiko for oppformering av for eksempel storknolla råtesopp (*Sclerotinia sclerotiorum*) anbefales det å ha et vekstskifte med minst 4-5 år uten dyrking av

andre mottakelige vekster (erter, bønner, gras, kløver, potet og et stort antall andre tofrøblada arter). Stilkselleri bør ikke inngå i vekstskifte med andre vekster fra skjermplantefamilien, som gulrøtter, dill og persille. Gode forgrøder er korn og kløverrik eng.

Sort	
Sådato	
Plantedato	
Høstedato	

Notater

Såtid: Den bør såes i kasser i februar-mars (sådybde 2mm). Jordtemp må være 18 - 20°C

Planteavstand: 25 - 35 cm

Radavstand: 50 -60 cm

Skadedyr/sykdom: Stilkselleri er følsom for mangel på bor og magnesium. Magnesiummangel forebygges ved å bruke magnesium- eller dolomittkalk når det kalkes. Bormangel medfører misdannede blader og dårlig vekst.

Utsatt for selleriminerflue, storknolla råtesopp, selleribladflekk

Tiltak: Fiberduk, luking, rovinsekter som snylteveps, kortvinger og løpebiller

Gjødsling: Nitrogennormen varierer avhengig av jordtype og vanningsmuligheter. Veiledende norm er cirka 20 kg nitrogen, 4 kg fosfor og 18 kg kalium per dekar.



Selleriminerflue



Selleribladflekk

